

Une prairie
sans épis

La pâture
abondante

Riche en sucre

IL MARQUE DES POINTS !



[NOUVEAUTÉ]

DROPPER

Ray-grass anglais



Carte d'identité

Nom latin : *Lolium perenne*

Ploïdie : diploïde

Précocité : Très tardif

Date de début d'épiaison :
10 juin

Souplesse d'exploitation :
74 jours

Remontaison :
Peu remontant


Pérennité : 4 à 5 ans

Répartition de production :
- printemps : 67 %
- été/automne : 33 %

Date d'inscription : 2014

Tous les détails sur
www.caussade-semences.com

>> Positionnement de DROPPER



- Espèce à forte contribution à la production fourragère
- Espèce d'accompagnement, autre rôle que strictement productif
- Espèce peu ou pas adaptée

>> Conseils d'associations

• Pâtûre :

TRIPLE

Trèfle blanc



DROPPER

Ray-grass anglais

Il marque des points


Semis

Densité : 25 kg/ha


Profondeur : 1 à 2 cm

Semer de préférence avant :

Printemps :



Automne :



Fertilisation

Pour un semis en pur :

Installation :

N : 30 à 40 unités

P : 150 unités

K : 150 à 200 unités

Exploitation :

N : 100 unités

(1ère pousse)

50 à 60 unités

(après chaque coupe)

Tous les détails sur www.caussade-semences.com

>> Une prairie sans épis

Raygrass à épiaison très tardive, **DROPPER** offre une large période d'exploitation.


Variété	Date d'épiaison	Souplesse d'exploitation
DROPPER	07/06	66
Moyenne RGA tardif	01/06	62

Herbe-book 2015

DROPPER préserve plus longtemps sa valeur alimentaire et son appétibilité.

>> La pâture abondante

Les variétés très tardives sont souvent décrites comme peu productives. Au contraire, **DROPPER** marque par son rendement.



CTPS 2014

+ 740 kg de MS/ha/an par rapport aux témoins.

>> Riche en sucre

Sa haute teneur en sucre et son excellente digestibilité assurent une qualité remarquable.

Teneur en sucre soluble



DROPPER

Source : CTPS 2014

Production laitière maximale avec une herbe productive, appétente plus longtemps et une bonne valeur énergétique.

>> Conseils de culture

- Rouler avant et après le semis.
- Un déprimaie précoce est recommandé.
- Un pâturage ras en fin d'automne permettra un démarrage plus précoce au printemps.

